Bella Family Dental

(972) 290-0903
347 W Jefferson Blvd, Dallas, TX 75208

Implantes dentales, injertos de hueso, elevación de seno y PRF

Incluye: Colocación de implantes, injertos de hueso, elevación de seno maxilar, PRF y la parte quirúrgica de las dentaduras sobre implantes.

Antes de su cita

- Siga tomando sus medicinas de siempre, a menos que su dentista o su médico le indique otra cosa. No deje de tomar un anticoagulante por su cuenta.
- Si un médico le indicó tomar antibióticos antes de sus citas dentales (por ejemplo, por ciertas condiciones del corazón o reemplazos de articulaciones), tómelos tal como se los recetaron.
- Si le recetaron una medicina para tomar antes de la cirugía, tómela tal como se la indicaron.
- Si va a recibir sedación oral, siga nuestras instrucciones de sedación, incluido tener a un adulto responsable que lo lleve y lo recoja.
- Si fuma o vapea, dejarlo antes y después de la cirugía ayuda a que el implante sane. Pídanos ayuda.
- Use ropa cómoda y planee descansar el resto del día.
- Infórmenos de cualquier cambio en su salud, medicinas o suplementos nuevos, alergias o embarazo.
- Llegue 30 minutos antes de su cita para completar el papeleo necesario y hacer cualquier pago pendiente. Si toma Halcion (sedación oral), llegue 1 hora antes.

Después de su cita

Sangrado

- Muerda una gasa durante 30 a 45 minutos. Es normal un sangrado leve durante uno o dos días.
- Si sigue sangrando, muerda otra gasa limpia y húmeda durante 30 minutos más, con la cabeza elevada.

Proteja la zona

- No escupa con fuerza, no use popote (pajilla), no fume ni vapee durante al menos las primeras 24 horas, o más si su dentista lo indica. Esto puede desprender el coágulo.
- No se enjuague con fuerza el primer día.
- No mastique sobre el implante ni lo presione con la lengua o los dedos.
- Si tiene un tapón de cicatrización o un diente provisional del mismo día, no muerda comida con él a menos que su dentista le diga que puede hacerlo.
- Si usa una dentadura o un diente removible (flipper) sobre la zona, úselo solo como le indique su dentista.

Después de una elevación de seno

- No se suene la nariz durante 4 semanas, o más si su dentista le pide que espere. Puede olfatear con suavidad. Si tiene que estornudar, estornude con la boca abierta.
- Un poco de sangrado por la nariz durante uno o dos días puede ser normal. Si la hinchazón es fuerte o tiene fiebre, llámenos al (972) 290-0903.
- Evite viajar en avión, bucear y cargar cosas pesadas durante 2 a 3 semanas, o hasta que su dentista se lo permita.

Hinchazón y comodidad

- Póngase una compresa fría en la mejilla, 20 minutos sí y 20 minutos no, durante las primeras 24 a 48 horas. Pueden salir moretones.
- Para las molestias, tome analgésicos de venta libre o recetados solo como le indicó su dentista y según la etiqueta.
- Si le recetaron antibióticos, tómelos completos como se los indicaron.
- No maneje ni tome alcohol mientras tome analgésicos recetados.

Comida

- Coma alimentos blandos y mastique del otro lado durante el tiempo que le indique su dentista. Al principio, evite comidas calientes, duras, crujientes o con semillas.

Limpieza de la boca

- A partir del día siguiente, enjuáguese suavemente con agua tibia con sal o con el enjuague que le dieron.
- Cepille los demás dientes normalmente y limpie cerca del implante con cuidado, como le indicaron.
- Una vez sano, limpie alrededor del implante todos los días, como un diente natural, y no falte a sus revisiones.

Si también le aplicaron PRF en la cara o la piel

- Siga también las instrucciones de cuidado facial que le dieron por escrito. Esas reglas de la piel no sustituyen las instrucciones de implante, injerto o elevación de seno de esta página. Vea también nuestras instrucciones de cuidado facial.

Cuándo llamarnos

Llámenos al (972) 290-0903 si tiene:

- Sangrado que no disminuye con presión firme
- Hinchazón o dolor que empeora después del tercer día, fiebre o pus
- Adormecimiento del labio, la barbilla o la lengua que no se ha quitado al día siguiente
- Un tapón de cicatrización, diente provisional o implante que se siente flojo
- Después de una elevación de seno: mucho sangrado por la nariz, o aire o líquido que pasa entre la boca y la nariz

Ante una emergencia médica, llame al 911. Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana si tiene dificultad para respirar o tragar, hinchazón que se extiende hacia el ojo o el cuello, o un sangrado que no puede controlar.

Estas son instrucciones generales. Si su dentista le dio instrucciones diferentes, siga esas. Nuestro personal habla inglés y español. Las doctoras no hablan español, pero nuestro equipo le ayuda con gusto.